



ISTILIKE 334 SL

Erbicid sistemic selectiv pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene în rapiță.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Clopiralid+picloram, (267+67) g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat solubil.

IMOD DE ACȚIUNE

Clopiralid și picloram sunt ușor absorbite de frunze și se răspândesc repede în plante până la punctele de creștere, inclusiv sistemul de rădăcină. Ambele ingrediente active sunt forme sintetice ale hormonului de creștere. Utilizarea lor duce la înlocuirea și blocarea funcțiilor hormonilor naturali din speciile de plante sensibile, care mor ca urmare a întreruperii proceselor de creștere.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Rapiță	0,3-0,35	Specii de pălămidă, Volbura de camp, Specii de lobodă, Fumărița medicinală, Turița agățătoare, Susai, Știrul sălbatic, Zămosița, Hrișca, Romanița	Prin stropirea semănăturilor primăvara până la apariția mugurilor florali	- (1)

PARTICULARITĂȚI DE APLICARE

- Efectul maxim este obținut prin tratarea buruienilor tinere, în creștere activă. Se recomandă utilizarea produsului când temperatura medie zilnică depășește 8°C.
- Nu efectuați tratamentul înainte de îngheț sau imediat după îngheț. Ploaie în 1-2 ore după tratament nu are impact asupra eficienței acestuia.
- Istilike 334 SL rezolvă cu succes problema de a controla turița agățătoare - una dintre cele mai problematice buruieni în cazul rapiței. Eficiența maximă a preparatului se asigură la înălțimea de 8 cm a turiței agățătoare. La o înălțime a buruieni de 9-15 cm preparatul inhibă creșterea și dezvoltarea ei, turița rămâne în nivelul inferior al culturii, nu formează semințe și nu prezintă nici un pericol pentru randamentul și calitatea rapiței.

- Istilike 334 SL trebuie aplicat cu o normă de 0,3 - 0,35 l / ha, consumul soluției de lucru: 150-400 l / ha. În culturile foarte dense, pentru a obține o bună acoperire a suprafeței frunzelor buruienilor, trebuie să fie aplicată doza maximă a soluției de lucru.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- fereastră largă de aplicare toamnă-primăvară;
- rezolvă cu succes problema combaterii unei game largi de buruieni;
- precipitațiile în 1-2 ore de la tratament nu au nici un impact asupra eficacității.

COMPATIBILITATE

În cazul urmăririi termenelor și timpului optim de aplicare a produsului Istilike 334 SL pot fi utilizate în astfel de amestecuri de rezervoare:

- Istilike 334 SL 0,35 l / ha + Vamp Duo 220 SC – 0,25ltr/ha (pentru a combate gargarița semințelor de crucifere și alți dăunători).
- Istilike 334 SL 0,35 l / ha + Baccard 125 EC 0,7 l / ha (pentru a combate buruienile anuale).
- Istilike 334 SL 0,35 l / ha + Baccard 125EC 1,0 l / ha (când culturile sunt înfundate cu Pirul târător).
- Într-o combinație de rezervor cu graminicid Baccard 125EC, eficacitatea produsului Istilike 334 SL crește împotriva lobodei albe, stirului sălbatic și a altor buruieni.

Nu este recomandat să amestecați Istilike 334 SL cu regulatori de creștere!

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

Sensibile: Ambrozia penifolie – *Ambrosia artemisiifolia*, Palamida – *Cirsium arvense*, Albăstriță comună – *Centaurea cyanus*, Măzăriche – *Vicia segetalis*, Ardei broaștei – *Persicaria maculosa*, Cornuti – *Xanthium spp*, Fumarita – *Fumaria officinalis*, Trifoi – *Trifolium spp*, Cruciulita – *Senecio vulgaris*, Podbal – *Tussilago farfara*, Susai (specii) – *Sonchus spp*, Zârnă neagră – *Solanum nigrum*, Turiță – *Galium aparine*, Romaniță – *Anthemis arvensis*.

Moderat sensibili: Busuioc sălbatic – *Galinsoga parviflora*, Hrișcă tătarască – *Fagopyrum tataricum*, Rocoină – *Stellaria media*, Mac de câmp – *Papaver rhoeas*, Spanac sălbatic – *Chenopodium album* (pînă la 4 frunze), Ochiul șarpelui – *Myosotis arvensis*, Lungurică – *Galeopsis tetrahit*, Viorele specii – *Viola spp.*, Sugel, Urzică moartă – *Lamium spp*.

Produsul nu distruge buruienile crucifere și cerealiere.