



Substanță activă: glifosat 360 g/l

Forma preparativă: concentrat solubil

Ambalaj: cutii din plastic de 1, 20 sau 200 l

Termen de garanție: până la 3 ani

Preparatul Klinik 360 SL – erbicid neselectiv pentru a eradica acțiunea sistemică pe baza glifosat. Acest erbicid distruge eficient buruienile perene cu rizomi și drajoni, gramineele și dicotiledonatele anuale, precum și vegetația lemnoasă nedorită.

MOD DE ACȚIUNE:

Datorită aditivilor speciali **Klinik 360 SL** pătrunde prin frunze și lăstarii verzi în plantă, se răspîndește prin partea aeriană și rădăcini, provocînd moartea în masă a conurilor de creștere.

În celulele ce se divid activ glifosatul inhibă sinteza de proteine, în special aminoacizi indispensabili (fenilalanina, tirozina și triptofanul).

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE:

Acest preparat este cel mai eficient în tratarea plantelor tinere, în creștere activă cu învelișul foliar bine dezvoltat, capabile să absoarbă cea mai mare cantitate posibilă de erbicid și să-l livreze la toate conurile de creștere.

- cîmpuri destinate pentru semănatul răsăritei, rapiței, lucernei, porumbului, sfeclei de zahăr, cartofului, cerealelor, soia, legumelor, ierburi graminee pentru semințe, cu 2 săptămîni înainte de semănat: 1,5-6,0 l/ha.
- pămînturi neagricole (fișii de protecție a liniilor electrice, conductelor de gaz și petrol, marginea drumurilor și terasamente de cale ferată): 3,0 – 6,0 l/ha;
- în calitate de desicant la rapiță, cereale și răsărită cu 2 săptămîni înainte de recoltare : 3,0 l/ha
- plantațiile cu culturi multianuale – măr, viță de vie: 3,0 – 6,0 l/ha.

RATA DE EXPUNERE:

Efectele vizuale (îngălbenire sau schimbarea nuanței frunzelor) pot fi observate la buruienile anuale după 5-7 zile, la cele perene - la 10-14 zile, iar la arbori și arbuști - în 20-30 zile. Pieirea completă survine în termeni de două ori mai mare față de cei indicați mai sus. Acțiunea preparatului este mai eficientă în cazul umedității sporite a solului și temperaturi optime ale aerului.

COMPATIBILITATE:

Klinik 360 SL este compatibil cu erbicidele 2,4 D (**Dicopur Top 464 SL, 2,4-D 500**).

În special poate fi recomandat: 2,0-3,0 l/ha **Klinik 360 SL + 0,8 l/ha Estet 905 EC** sau **1,0 l/ha 2,4-D 500** pe miriște sau terenuri necultivate împotriva unui complex de buruieni anuale și multianuale.

ATENȚIE!

Restricții importante privind utilizarea preparatului - este interzisă tratarea:

- în cazul situațiilor de stres meteorologic pentru buruieni (secetă, arșiță, îngheț), cînd creșterea lor este încetinită sau sînt vizibile semne de îmbătrînire;
- îndată după cultivare, cînd erbicidul nu poate pătrunde la conul de creștere a rădăcinilor (în special pentru plantele cu rizomi);
- dacă se așteaptă ploaie sau rouă mare în termen de 5-6 ore după tratare, cînd erbicidul poate fi spălat de pe suprafața plantelor;
- dacă se utilizează apă murdară, ce conține particule de sol sau argilă, care pot absorbi o parte din substanța activă din amestecul din rezervor;
- cînd plantele sînt acoperite cu un strat de praf sau noroi, din același motiv;
- pe timp de vînt, cînd este pericol de pulverizare a preparatului pe culturile vecine.

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA:

CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	Norma de consum, l/ha	MODUL ȘI TERMENUL DE APLICARE	PERIOADA DE PAUZĂ/ NUMĂRUL DE TRATAMENTE
Mar, vita de vie	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	2,0 – 4,0	Prin stropire în faza de creștere intensivă (3-5 frunze) a buruienilor, cu condiția protejării culturii	30/ (1)
Mar, vita de vie	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	4,0 – 6,0	Prin stropire în faza de creștere intensivă (15-20 cm) a buruienilor, cu condiția protejării culturii	-/ (1)
Rapita (cu excepția sectoarelor semincere)	desicarea rapitei	2,5 – 3,0	Prin stropirea sematurilor la brunificarea a circa 70% din silicve (cu 14 zile până la recoltarea rapitei)	14/ (1)
Floarea soarelui (cu excepția sectoarelor semincere)	desicarea florii soarelui	2,5	Prin stropirea plantelor la începutul brunificării calatidiilor la umiditatea semintelor nu mai mare de 38%	14/ (1)