



RIMAX 750 WG

Erbicid sistemic post-emergent pentru a controla o gamă largă de buruieni anuale și perene în cereale.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Tribenuron-metil, 750 g/kg.

FORMA PREPARATIVĂ

Granule dispersabile în apă.

MOD DE ACȚIUNE

Este un erbicid sistemic. Substanța activă pătrunde în plante prin părțile aeriene, blochează diviziunea celulelor buruienilor sensibile, iar ca urmare, creșterea acestora se stopează în decurs de câteva ore după tratament. Asigură controlul buruienilor dicotiledonate pe tot parcursul perioadei de vegetație (în absența celui de-al doilea "val" de buruieni). Erbicidul pătrunde rapid prin frunze și se translocă în întreaga plantă, dar moartea completă a buruienilor se observă la 2-3 săptămâni după tratament. Manifestarea inhibării creșterii depinde de condițiile meteorologice la momentul tratamentului (umiditate, temperatură), compoziția specifică a buruienilor și faza de dezvoltare a acestora. Buruienile tinere sunt mai sensibile la acțiunea erbicidului.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, kg/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Grâu	0,02-0,025	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	Prin stropirea semănăturilor în faza de înfrățire a culturii, faza inițială de creștere a buruienilor	- (1)
Floarea-soarelui	0,025-0,03	Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene	Prin stropirea semănăturilor în faza de 4-6 frunze ale culturii	

PARTICULARITĂȚI DE APLICARE:

- Preparatul este mai eficient dacă se utilizează în stadiile incipiente de dezvoltare a buruienilor vegetative: dicotiledonate anuale (2-4 frunze), turița agățătoare (3-4 internoduri), pălămidă-de-câmp (4-6 frunze în rozete).

- Primele semne vizibile ale erbicidului asupra buruienilor apar la 7-10 zile după aplicare, distrugerea completă a buruienilor are loc la 14-21 zile. Vremea caldă și umedă își accelerează efectul; vremea rece și uscată încetinește efectul.
- Produsul începe să acționeze asupra buruienilor la o temperatură zilnică medie a aerului de +15 °C. Temperatura optimă a aerului este de la + 15 °C la + 20 °C.
- Rata de doză a soluției de lucru în timpul pulverizării la sol este de 200-300 litri pe hectar.
- Cerință obligatorie este de a asigura acoperirea și umectarea abundentă a plantelor după aplicarea preparatului.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- selectivitate ridicată la plantele cultivate.
- o perioadă lungă de aplicare - de la apariția a două frunze până la apariția frunzei standard a culturii;
- controlul unei game largi de buruieni problematice, cum ar fi pălămidă-de-câmp, turiță agățătoare și altele;
- acționează asupra buruienilor la o temperatură medie a aerului zilnic de + 5 °C;
- o combinație reușită de preț, calitate și eficiență;
- ambalare reușită: sticlă de plastic de 100 de grame cu cană de măsurare;
- preț rezonabil pe unitate de suprafață.

COMPATIBILITATE

Produsul este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Cu toate acestea, în fiecare caz separat, componentele trebuie verificate pentru compatibilitate. Nu utilizați produsul în amestec de rezervor cu insecticide organofosfatice, îngrășăminte pentru hrănirea foliară.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

Speciile sensibile:

Știr (*Amaranthus retroflexus*), Neghina (*Agrostema githago*), Rocoina (*Stelaria media*), Mușetel sălbatic (*Matricaria* spp), Lungurica (*Galeopsis tetrahit*), Iarba grasă (*Portulaca oleracea*), Ridichea sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), Mustar sălbatic (*Sinapis arvensis*), Traista ciobanului (*Capsella bursa pastoris*), Loboda sălbatică (*Atriplex patula*), Spanac sălbatic (*Chenopodium album*), Zarna (*Solanum nigrum*), Margelusa (*Lithospermum arvense*), Hrisca (*Polygonum convolvulus*), Macul sălbatic (*Papaver rhoeas*), Macris (*Rumex* spp), Pungulita (*Thlaspi arvense*), Mazariche (*Vicia* spp), Păpădie (*Taraxacum officinale*), Troscot (*Polygonum aviculare*), Pălămidă (*Cirsium arvense*), Susai (*Sonchus* spp), Piciorul cocoșului (*Ranunculus arvensis*).

Specii moderat sensibile:

Albăstrița (*Centaurea cyanus*), Turița lipicioasă (*Galium aparine*), Viorele (*Viola arvensis*), Spalacioasă (*Senecio vulgaris*), Păpădia (*Taraxacum officinale*), Fumarita (*Fumaria officinalis*).

Specii slab sensibile:

Ambrozia (*Ambrosia artemisiifolia*), Volbura (*Convolvulus arvensis*), Doritoare (*Veronica hederifolia*), Trei frați pătați (*Viola tricolor*).