Rezistență la virusul galben al ridichii

Rezistența la Phoma

Rezistență la spargerea păstăilor

Rezistență excepțională la iernare

# MANHATTAN

Fundație sănătoasă pentru culturi de top.

## CARACTERISTICI

- Hibrid viabil îmbunătățit, cu toleranțe și rezistențe la cei mai importanți agenți patogeni din cultura de rapiță (Virusul galben al ridichii, Phoma RLM7, Sclerotinia, Verticilium)
- Toleranță dovedită la secetă și scuturarea silicvelor
- Adaptabilitate ridicată în diferite condiții climatice
- Hibridul este recomandat in tehnologii normale dar si intensive cu o norma de semănat recomandată de 40-50 b.g./mp
- Se poate semăna atât la începutul epocii optime cât și la finalul acesteia;
- Pretabil pe toate tipurile de sol și de asemnea în sistem minimum tillage

### Caracteristici morfo-biologice

| Caracteristici | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezvoltare în toamnă | Lentă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | Rapidă |
| Răspuns la regulatorii de creștere | Slab | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Bun |
| Rezistență la iernare | Scăzută | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Înaltă |
| Reluarea în vegetației primăvara | Lentă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | Rapidă |
| Înflorire | Timpurie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Târzie |
| Rezistență la putregaiul rădăcinii și tulpini | Scăzută | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | Înaltă |
| Rezistență la secetă | Scăzută | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | Înaltă |
| Rezistență la cădere | Scăzută | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | Înaltă |
| Tipul de coacere | Timpurie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Târzie |
| Rezistență la crăparea silicvelor | Scăzută | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Înaltă |