

SAKSON 240 EC

Sakson 240 EC este un erbicid selectiv, postemergent, cu spectru larg de acțiune, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Cletodim, 240 g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat emulsionabil.

MOD DE ACȚIUNE:

Erbicidul are acțiune sistemică, fiind preluat prin frunzele buruienilor graminee și transportat acropetal și bazipetal până la rădăcini și rizomi. Acțiunea este imediată, dar primele simptome sunt vizibile la 2-4 zile de la pulverizare. În 5-7 zile de la tratament, creșterea buruienilor se oprește, iar rumenirea la punctele de creștere și cloroza frunzelor devin evidente.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Floarea - soarelui	0,5	Buruieni monocotiledonate anuale	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-4 frunze ale buruienilor anuale	70 (1)
	0,8	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene	

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE

Erbicidul se aplică în perioada de creștere intensă a buruienilor, atunci când acestea au minimum 3 frunze formate (buruieni anuale cu înălțime medie de 5-10 cm și perene de 15-20 cm). În zonele secetoase, se aplică imediat după irigare sau după căderea ploilor, imediat ce se poate intra în câmp.

- Pentru eficiență maximă, trebuie evitată aplicarea atunci când există condiții de ploaie, iar irigarea nu trebuie să aibă loc timp de 2 ore după aplicare.
- Pentru combaterea mai eficientă a buruienilor perene, nu se recomandă prașila mecanică sau manuală cu 5-7 zile înainte și după tratament, pentru a evita răspândirea rizomilor de buruieni.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- Cea mai mare eficiență economică în lupta împotriva buruienilor graminee.
- Controlează aproape toate tipurile de buruieni monocotiledonate anuale și perene din culturile cu frunza lată, inclusiv buruienile greu combătute (pirul tărător, pir gros, costrei).
- Manifestarea rapidă a acțiunii erbicidului.
- Poate fi aplicat indiferent de faza de dezvoltare a culturii.

COMPATIBILITATE

Utilizarea produsului în amestec cu alte erbicide poate reduce activitatea erbicidă. Nu se recomandă amestecarea cu îngrășăminte.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

Buruienile monocotiledonate anuale și perene, samulaștra de grâu, porumb și: *Setaria faberi* (mohor), *Setaria viridis* (mohor), *Sorghum halepense* (costrei) din sămânță, *Digitaria sanguinalis* (meișor), *Echinochloa crus-galli* (iarbă bărboasă), *Alopecurus myosuroides* (coada vulpii), *Cynodon dactylon* (pir gros), *Agropyron repens* (pirul tărător).