



РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ, используется для укрепления стебля зерновых культур и как регулятор роста рапса

Действующее вещество: хлорид хлормеквата 750 г/л

Препартивная форма: водный раствор

Срок хранения: до 3 лет

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Действующее вещество проникает в растение в основном через листья, а также частично через корни. Оно вызывает уменьшение скорости роста растения в высоту и увеличивает диаметр стебля, усиливая таким образом его прочность. В результате этого растения становятся более устойчивы к полеганию, уменьшается риск проникновения возбудителей гнилей в корневую шейку растений. Кроме этого **Stabilan 750 SL** способствует равномерности цветения и созревания зерна, стимулируя процессы образования хлорофилла в листьях и развитие корневой системы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

На фоне применения полных доз минеральных удобрений на зерновых культурах лучшие результаты достигаются при распределении норм 1,5 и 2 л/га на два опрыскивания –0,75 л/га или 1,0 л/га в начале фазы кущения и такие же дозы за неделю до окончания фазы кущения/начала выхода в трубку.

Практика показала, что применение полных доз минеральных удобрений приводит к интенсивному росту надземной части растений и отставанию роста корней. Это опасно в засушливых условиях Молдовы. Растения пшеницы не успевают сформировать достаточно глубокую и разветвленную корневую систему и в дальнейшем сильно страдают от засухи. Применение **Stabilan 750SL** в марте после внесения азотных удобрений по мерзло-талому грунту тормозит развитие надземной части и заставляет растение формировать корневую систему, что ведет к повышению засухоустойчивости пшеницы и увеличивает урожай и его качество.

Осадки не влияют на действие **Stabilan 750 SL** после двух часов после применения препарата.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Stabilan 750SL можно применять в баковых смесях с гербицидами, фунгицидами и удобрениями для листовой подкормки. Особено хорошо зарекомендовало себя применение баковой смеси с фунгицидом **Mystik 25 EC** на рапсе. При таком опрыскивании обеспечивается защита растений этой культуры от грибных инфекций, утолщение корневой шейки, формирование развитой корневой системы, что приводит к уменьшению потерь растений рапса в зимний период и повышению засухоустойчивости при весенней обработке.

Норма препаратов в баковой смеси рассчитывается в зависимости от количества листьев на растении, на один лист – 0,1 л **Mystik 25 EC** + 0,2 л **Stabilan 750 SL** в фазе 4 – 6 листьев культуры.

ВНИМАНИЕ!

Не проводить обработки Stabilan 750SL, если до или после его применения ожидаются заморозки, на слаборазвитых растениях, изреженных посевах или в условиях засухи!

РЕГИСТРАЦИЯ В МОЛДОВЕ:

КУЛЬТУРА	НОРМА, л/га	ВРЕМЯ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Пшеница озимая	1,0 – 2,0	Сорта с тенденцией к полеганию от средней до высокой Срок применения – от начала кущения до выхода в трубку (фазы 21-31, лучшая фаза 25)
Рапс	1,0	Срок применения – осенью в фазе 2-3 листа
Рапс	1,5 - 2,0	Срок применения – осенью в фазе 4-6 листов