

Наше класичне молоко вироблене з любов'ю у заповідному Озерному краї Великої Британії. Ми не додаємо пальмову олію, рибачий жир та підозрілі інгредієнти. Для зміцнення імунітету вашої малечі ми пропонуємо поживні речовини цільного молока, ДНА (Омега-3) рослинного походження та НМО (олігосахариди грудного молока).



ЦІЛЬНЕ МОЛОКО



БЕЗ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ



БЕЗ ГМО



МІСТИТЬ ГАЛАКТО-ОЛІГОСАХАРИДИ



ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВЕГЕТАРІАНЦІВ



ВІРБЛЕНО У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

**Kendamil Дитяча суха молочна суміш 2 етап з 6 до 12 місяців, Кендаміл.**

**Дитяче харчування ТМ «Kendamil» Kendamil Дитяча суха молочна суміш 2 етап з 6 до 12 місяців**

**Використання**

**Kendamil Дитяча суха молочна суміш 2 етап** призначена для задоволення особливих харчових потреб вашої дитини з 6 місяців і для підтримки її здорового розвитку:

- післягрудноговигодовування
- після будь-якої іншої дитячої суміші
- як заміна будь-якої суміші для подальшого годування дитини з 6 місяців.

**Склад:** цільне молоко (107 г на 100 г), лактоза (з молока), демінералізований молочний сир - ватковий порошок (збагачений альфа-лактальбуміном), рослинні олії (соняшникова, кокосова, ріпакова), галакто-олігосахариди (з молока), знежирене молоко, цитрат кальцію, хлорид калію, цитрат натрію, хлорид магнію, гідроксид калію, докозагексаєноєва кислота, аскорбат натрію, інозитол, арахідонова кислота, таурин, холін бітарат, тирозин L, нуклеотиди (цитидин-5'-монофосфат, динатрій-утрин-5'-монофосфат, динатрій-утрин-5'-монофосфат, динатрій-інозин-5'-монофосфат, динатрій-гуанозин-5'-монофосфат), пірофосфат заліза, L-фенілаланін, сульфат цинку, вітамін E, ніацин, кальцій пантотенат, сульфат міді, тіамін, рибофлавін, вітамін A, вітамін B6, сульфат марганцю, фолієва кислота, йодид калію, селеніт натрію, вітамін K, вітамін D, біотин, вітамін B12. Не містить глютену, без ГМО.

Марганець	мкг (µg)	57	7,4
Фтор	мг (mg)	<0,1	<0,015
<b>Інші</b>			
Таурин	мг (mg)	45	5,8
Холін	мг (mg)	170	23
Інозитол	мг (mg)	100	13
L Карнітин (природний)	мг (mg)	6,8	0,9
Нуклеотиди	мг (mg)	22	2,8

\* цукри, що отримуються з молока

### Інструкція з годування (6 місяців - 1 рік).

Цю інструкцію з годування слід використовувати тільки в якості рекомендацій. Всі діти різні, тому їм може знадобитися більше або менше суміші, ніж зазначено далі. Kendamil Дитяча суха молочна суміш 2 етап призначена для задоволення особливих харчових потреб Вашої дитини з 6 місяців і для підтримки її здорового розвитку.

### Приготування

Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій при приготуванні суміші. Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу може завдати шкоди здоров'ю вашої дитини, в тому числі, через зростання небажаних бактерій. Завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням і не використовуйте залишки раніше приготованої суміші. Завжди використовуйте суміш протягом 2-х годин. Завжди стерилізуйте посуд для годування перед приготуванням суміші. Миття та ополіскування пляшечки і соски мають бути ретельними.

- Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 70°C.
- Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
- Наложіть мірну ложку сухої суміші, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку для годування.
- Шільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
- Охолодіть готову молочну суміш до температури годування
- (приблизно 37°C). Перевірте температуру!

### Забораються

Використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Будь ласка, не підігрівайте молочну суміш в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву). Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

### Дозування

Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість молочної суміші на одне годування може візнитися. Вашій дитині не обов'язково випивати всю пляшечку до кінця. Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки. На кожному мірну ложку без верху сухої суміші Kendamil 2 додавайте 30 мл кип'яченої води. 1 мірна ложка без верху = приблизно 4,6 г сухої суміші.

Кількість свіжокип'яченої та охолодженої води на один цикл годування у мл.	Кількість ложок для приготування суміші
<b>150</b>	<b>5</b>
<b>180</b>	<b>6</b>
<b>210</b>	<b>7</b>

З 6 місяців вашої дитині буде потрібно близько 600 мл молочної суміші Kendamil 2 на день у вигляді пиття або молочної суміші. Проконсультуйтеся у свого лікаря, якщо вам потрібні додаткові поради. Діти потребують близько 5 прийомів їжі на день. Кожен шойно введений додатковий прийом їжі (піюре / каша) замінює одне годування з пляшечки.

### Важлива інформація для харчування вашої дитини.

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком споживання молочної суміші необхідна консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. Як і будь-яка інша молочна суміш, Kendamil Дитяча суха молочна суміш 2 етап, як правило, призначена для дітей з шести місяців при змішаному вигодовуванні, а не в якості замінича грудного молока протягом перших шести місяців.

### Запаковано в захисному середовищі.

**Умови зберігання:** закрити упаковку зберігати до температури не вище 25°C та відносної вологості повітря не більше 75%. Відкрити упаковку закрити кришкою (прикрити) та зберігати в сухому прохолодному місці (але не в холодильнику). Відкрита упаковка має бути використана протягом 4-х тижнів.

**Маса нетто (банка):** 800 г (g).

**Дата виробництва:** див. після «MANF» у форматі день, місяць, рік.

**Дата завершення мінімального терміну придатності «Краце спожити до»:** (день, місяць, рік) див. на дні упаковки.

**Номер партії:** див. на дні упаковки.

**Виробник:** «Kendal Nutricare Ltd., Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, LA9 6NL; Great Britain, («Кендал Нутрікар Лтд», Мінт Брідж Роад, Кендал, Камбрія, LA9 6NL), Велика Британія.

**Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача:** ТОВ «Бєбішоп», Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28, тел.: (044) 323-09-01, код за ЄДРПОУ 41172555

ma.com.ua

Інформація про склад		На 100 г (g)	На 100 мл(мл)
Енергетична цінність (калорійність)	кДж (к) / ккал (ккал)	2160/518	279/67
<b>Жири</b>	г (g)	3,6	
з яких насичені	г (g)	9	1,2
з яких ненасичені	г (g)	19	2,4
<b>Омега 3</b>			
α-Ліноленова кислота (ALA)	мг (mg)	390	50
Докозагексаєноєва кислота (DHA)	мг (mg)	125	16,1
<b>Омега 6</b>			
Ліноленова кислота (LA)	мг (mg)	4185	540
Арахідонова кислота (ARA)	мг (mg)	62	8
<b>Вуглеводи</b>	г (g)	56	7,2
з яких цукри*	г (g)	53	6,8
з яких лактоза	г (g)	51	6,6
<b>Клітковина</b> (харчові волокна)	г (g)	2,1	0,27
з яких ГОС (галактоолігосахариди)	г (g)	1,8	0,23
з яких ФОС (фруктоолігосахариди)	г (g)	0,2	0,03
з яких 3'G'L (галактосиллактоза)	г (g)	0,1	0,01
<b>Білок</b> (N x 6,25)	г (g)	10,3	1,3
<b>Вітаміни</b>			
Вітамін A	мкг-RE (µg -RE)	400	52
Вітамін D3	мкг (µg)	10,5	1,35
Вітамін E	мг-α-TE (mg-α-TE)	14	1,8
Вітамін K	мкг (µg)	28	3,6
Вітамін C	мг (mg)	85	11
Тіамін	мг (mg)	0,45	0,06
Рибофлавін	мг (mg)	1	0,13
Ніацин	мг (mg)	4,7	0,6
Вітамін B6	мг (mg)	0,37	0,05
Фолат / Фолієва кислота	Мкг (DFE) / мкг (DFE)	110	14
Вітамін B12	мкг (µg)	0,9	0,12
Пантотенова кислота	мг (mg)	3,5	0,45
Біотин	мкг (µg)	18	2,3
<b>Мінерали</b>			
Натрій	мг (mg)	162	21
Калій	мг (mg)	555	71
Хлорид	мг (mg)	362	47
Кальцій	мг (mg)	350	45
Фосфор	мг (mg)	205	26
Магній	мг (mg)	47	6,3
Залізо	мг (mg)	5,8	0,75
Цинк	мг (mg)	4	0,45
Мідь	мг (mg)	0,41	0,053
Йод	мкг (µg)	100	13
Селен	мкг (µg)	18	2,3