



SPEEDFOL MARINE SL

Speedfol Marine SL – biostimulator cu un conținut ridicat de auxine, obținut din extract de alge *Ecklonia maxima*. Îmbogățit cu elemente P, K, Zn, B și L-aminoacizi, acest produs stimulează dezvoltarea sistemului radicular, precum și dezvoltarea echilibrată a plantelor și fructelor.

COMPOZIȚIA

	N, total	P ₂ O ₅	K ₂ O	B	Zn (EDTA)	L-aminoacizi	Auxine, mg/l	Citokinine, mg/l
%	0,29	7,3	4,9	0,089	0,26	5,1	10,56	0,03
g/l	3,5	87,6	58,8	1,07	3,12	61,2		

ACȚIUNEA PREPARATULUI

- Formează rezistență plantelor la stres (frig, îngheț, căldură). Eficiența excepțională a biostimulatorului se datorează prezenței poliaminelor. Este obținut din extract de alge *Ecklonia maxima*, care crește pe coasta de sud-est a Africii și conține o serie de regulatori naturali de creștere a plantelor.
- Conține o cantitate mare de fitohormoni, vitamine, complexe organice, polizaharide, L-aminoacizi și macro- și microelemente. Stimulează dezvoltarea sistemului radicular, activează fecundarea și dezvoltarea fructelor. Dimensiunea mică a moleculelor optimizează absorbția biostimulatorului de către plantă.

DESTINAȚIA

Speedfol Marine este un produs unic, fără analogi pe piața îngrășămintelor. Conține exclusiv extract de alge marine *Ecklonia maxima*, care furnizează fitohormoni de origine naturală. Fitohormonii sunt substanțe care ajută la reglarea proceselor fiziologice ale plantelor. Când o plantă este stresată, procesele sale metabolice sunt perturbate. Hormonii din extractul de alge sunt introduși în plantă prin stropire foliară. Odată pătrunși în țesuturi, fitohormonii declanșează reacții biochimice care ajută planta să își revină rapid după stres.

MODUL DE APLICARE

Cultura	Fertilizare foliară în perioada de vegetație	
	Norma, l/ha	Perioada, particularități de aplicare
Culturi de câmp	0,3-1,0 Concentrația maximă a soluției de lucru 2%	- Tratament foliar la 1-3 săptămâni după răsărire sau după plantare. - Aplicări ulterioare la intervale de 1-2 săptămâni, dacă este necesar. - Ultima aplicare – nu mai târziu de 3 săptămâni înainte de recoltare.
Legumicole, pomi, vița de vie	0,5-4,0 (10-40 ml/10 l de apă la 100 m ²) Concentrația maximă a soluției de lucru a tuturor componentelor este de 2%	
Pomi, arbuști fructiferi, legumicole, flori și plante decorative	Concentrația maximă a soluției de lucru a tuturor componentelor este de 0,5-2%	Înmuierea materialului săditor (sistemul radicular la răsaduri, rizomi, tuberculi, bulbi, butași) timp de 5 minute înainte de plantare.
Culturi de câmp, legumicole, arbuști fructiferi	0,5-2,0	irigare prin picurare

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE:

- Se recomandă aplicarea dimineața devreme sau după-amiază.
- Nu se utilizează dacă pe suprafața frunzelor există umiditate sau în condiții de căldură excesivă. A nu se aplica pe vreme ploioasă sau foarte uscată.
- Pentru aplicare, se pot folosi orice tipuri de pulverizatoare disponibile în gospodărie.
- Este, de regulă, compatibil cu majoritatea produselor de protecție a plantelor, atât chimice, cât și biologice.
- Concentrația maximă a soluției de lucru nu trebuie să depășească 2% (adică nu mai mult de 2 litri de produs la 100 litri de apă). Este strict recomandat să se efectueze un test de compatibilitate înainte de amestecarea cu alte produse.