



## PRESTO 50 WP

**Локально-системный фунгицид с выраженным защитным, профилактическим и лечебным действием, обладающий искореняющим эффектом.**

### ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Цимоксанил, 500 г/кг.

### ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Смачивающийся порошок.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Фунгицид Presto 50 WP содержит цимоксанил, который быстро проникает в листья и другие части растения, обеспечивая защитное действие в короткие сроки. Хотя цимоксанил не может перемещаться внутри растения, его способность проникать в ткани и высокая устойчивость к смыванию делают препарат эффективным в борьбе с грибковыми заболеваниями. Цимоксанил активно действует против фитопатогенных грибов, таких как милдью, фитофтороз, ризоктониоз, альтернариоз и других.

### РЕГИСТРАЦИЯ В МОЛДОВЕ

Культура	Норма расхода препарата, кг/га	Спектр действия	Способ, время обработки	Срок ожидания/ (кратность обработки)
Картофель	0,5	Фитофтороз Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	21 (2-3)
Виноград	0,3-0,5	Милдью		21 (3)
Томаты	0,5	Фитофтороз Альтернариоз		21 (3)

### ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Профилактическое применение:** Наиболее эффективен при применении до инфицирования или в течение 1-2 дней после заражения.
- Интервалы между обработками:** В обычных погодных условиях рекомендуется проводить обработку с интервалом 10-12 дней. При дождливых условиях, особенно в периоды интенсивного роста растений, когда риск инфицирования высок, интервал между обработками следует уменьшить до 7-8 дней.

- **Норма расхода:** Зависит от фазы развития культуры и степени развития болезни. Минимальные дозы применяются при низком уровне инфекционного фона, максимальные – когда листовая поверхность полностью развита или уровень инфекции высок.
- **Эффективность:** Применение наиболее эффективно в начале вегетации и при первых признаках заболевания. Для более полного контроля интервал между обработками не должен превышать 7-14 дней при применении с контактными фунгицидами.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

- Эффективная профилактическая и лечебная защита от проблемных заболеваний.
- Длительное лечебное действие.
- Высокая гибкость в применении.
- Не вызывает резистентности.
- Хороший синергетический эффект при смешивании с другими продуктами.
- Безопасность в применении благодаря быстрому проникновению в растение.
- Отличная устойчивость к смыванию через 1-2 часа после применения.
- Длительное сохранение активности на поверхности листьев.

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Presto 50 WP совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых в сельском хозяйстве. Однако перед приготовлением баковых смесей с другими пестицидами следует проверить совместимость препаратов.