



REGULATOR DE CREȘTERE, se utilizează pentru a consolida tulpina cerealelor și ca regulator de creștere la rapiță

Substanța activă: clorură de clormecuat 750 g/l

Forma preparativă: concentrat solubil

Termen de garanție: până la 3 ani

MOD DE ACȚIUNE:

Substanța activă pătrunde în plantă în special prin frunze, parțial – prin rădăcini. Ea provoacă micșorarea vitezei de creștere a tulpinilor și mărește diametrul, consolidând, astfel trăinicia lor. În rezultat plantele devin mai rezistente la polignire, se micșorează riscul de pătrundere a agenților putregaiului în rădăcină. Totodată utilizarea **Stabilan 750 SL** asigură uniformitatea înfloririi și coacerii semințelor, stimulând procesele de formare a clorofilei în frunze și dezvoltarea sistemului radicular.

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE:

În cazul utilizării unor doze complete de îngrășăminte minerale pe culturile de cereale cele mai bune rezultate se obțin la divizare dozelor 1,5 și 2 l/ha pentru două stropiri – 0,75l/ha sau 1 l/ha la începutul înfrățirii și aceeași doză cu o săptămână înainte de încheierea fazei de înfrățire/începutul apariției paiului.

Experiențele demonstrează, că utilizarea îngrășămintelor minerale stimulează creșterea intensă a părții aeriene a plantelor și reținerea creșterii rădăcinilor. Aceasta este pericol în condițiile de climă secetoasă a Moldovei. Plantele de grâu nu reușesc să-și formeze un sistem radicular ramificat și suficient de adânc, deaceia suferă din cauza secetei. Utilizarea **Stabilan 750SL** în luna martie după aplicarea îngrășămintelor cu azot pe solul parțial înghețat stopează dezvoltarea părții aeriene și impune planta să-și dezvolte sistemul radicular, ce asigură o rezistență mare la secetă și creșterea cantității și calității recoltei.

COMPATIBILITATE:

Stabilan 750SL poate fi utilizat în amestecul din rezervor cu erbicide, fungicide și îngrășăminte. În special este apreciată utilizarea simultană cu fungicidul **Mystik 25 EC** pe rapiță. Astfel se asigură protecția de infecții fungice, îngroșarea nodului radicular, formarea sistemului radicular puternic, ce micșorează moartea plantelor de rapiță în timpul iernii și crește rezistența la secetă la tratarea de primăvară.

Doza de utilizare se calculează în dependență de numărul frunzelor pe plante: la o frunză 0,1 l **Mystik 25 EC** + 0,2 l **Stabilan 750 SL** în faza de 4 – 6 frunze.

Precipitațiile nu influențează acțiunea **Stabilan 750 SL** deja după două ore de la tratare.

ATENȚIE!

Nu se admite tratarea cu Stabilan 750SL, dacă pînă și după utilizare se așteaptă înghețuri, pe plantele slab dezvoltate, rare, su în condiții de secetă!

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA:

CULTURA	DOZA, l/ha	TIMPUL ȘI MODUL DE UTILIZARE
Grâu de toamnă	1,0 – 2,0	Soiurile cu tendință de polignire de la medie la înaltă Temen de utilizare – de la începutul înfrățirii pînă la apariția paiului (fazele 21-31, cea mai bună faza 25)
Rapiță	1,0	Termen de utilizare – toamna în faza de 2-3 frunze
Rapiță	1,5 - 2,0	Termen de utilizare – toamna în faza de 4-6 frunze