



VAMP 200 SP

Vamp 200 SP - este un insecticid sistemic din grupa produselor neonicotinoidice, cu o acțiune rapidă, dar și sistemicitate ridicată, pentru combaterea cu succes a unui număr mare de dăunători prezenți în culturile agricole.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Acetamiprid 200 g/kg.

FORMA PREPARATIVĂ

Pulbere solubilă în apă.

MOD DE ACȚIUNE

Vamp 200 SP este un insecticid care conține substanța activă *Acetamiprid*, ce face parte din grupa produselor neonicotinoidice. Acetamipridul are un efect sistemic și translaminar, ceea ce permite absorbția sa de către plantă, distribuindu-se în toate organele acesteia. Acesta blochează receptorii nicotiniici postsinaptici, întrerupând transmiterea impulsurilor nervoase. Dăunătorii mor atât din cauza contactului direct cu insecticidul, cât și prin hrănirea cu plantele tratate. Insecticidul afectează activitatea sistemului nervos al insectelor, provocând excitare nervoasă excesivă, paralizie și, ulterior, moartea acestora. Durata de acțiune protectoare este de 14-21 de zile, iar efectul complet asupra dăunătorilor se manifestă în 1 - 1,5 ore de la aplicare.

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA

Cultura	Norma de consum, kg/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ numărul de tratamente
Măr	0.2	Viermele merelor Molia cojii fructelor Păduchele verde al mărului Molii miniere	Prin stropire în perioada de vegetație	45 (2)
Grâu	0.1-0.12	Ploșnița asiatică a cerealelor Tripsul grâului, Afide		30 (2)
Rapiță	0.1-0.12	Gândacul lucios al rapiței Gărgărița tulpinilor de varză Păduchele cenușiu al verzei		30 (2)

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- capacitatea de a distruge dăunătorii chiar și în zonele netratate ale plantei;
- un nou mecanism de acțiune care nu induce rezistență;
- activitate biologică ridicată chiar și la temperaturi ridicate ale aerului;
- lipsa fitotoxicității;
- nivel scăzut de pericol pentru oameni, albine și animale;
- compatibilitate cu majoritatea pesticidelor;
- păstrarea proprietăților în timpul fluctuațiilor de temperatură.

COMPATIBILITATE

Vamp 200 SP poate fi amestecat cu alte insecticide. Utilizarea sa în combinație cu preparate pe bază de fosfați organici, carbamați sau clorhidrocarburi poate crește semnificativ eficiența tratamentului și extinde perioada de protecție. Aplicând această strategie, se pot reduce costurile măsurilor de protecție și se poate obține un control mai eficient asupra dăunătorilor.