



FOBOS 100 EC

Fungicid sistemic cu acțiune preventivă și curativă pentru protejarea culturilor de semințoase, sâmburoase, leguminoase inclusiv viță de vie contra bolilor de făinare și altele.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Penconazol, 100 g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat emulsionabil.

MOD DE ACȚIUNE

Fobos 100 EC este un fungicid sistemic cu acțiune preventivă, curativă și de blocare a dezvoltării bolilor. Este rapid absorbit de toate părțile verzi ale plantei, în special de frunzele direct atinse de soluția de tratament. Acesta acționează și prin vapori, protejând zonele neatinse de produs, aflate în apropiere de părțile tratate. Fobos 100 EC este eficient în combaterea bolilor fungice prin interferența cu biosinteza sterolilor din membranele celulare ale ciupercilor.

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Măr	0,35-0,4	Făinare	Prin stropire în perioada de vegetație	20 (2-3)
Vița de vie				20 (4)

PARTICULARITĂȚI DE APLICARE:

1. Vița de vie:

- Tratamentele se vor efectua conform avertizărilor locale.
- Primul tratament cu Fobos 100 EC se aplică preventiv, înainte de dezvoltarea bolii.
- Dacă apar simptome de făinare, se aplică 2-3 tratamente consecutive la interval de 5-7 zile, pentru a încetini extinderea bolii și a bloca dezvoltarea acesteia.

- În condiții normale, tratamentele preventive se aplică la interval de 8-14 zile, în funcție de condițiile climatice și evoluția bolii.
- **Numărul maxim de tratamente:** 3 pe sezon.
- **În caz de presiune ridicată:** Este necesară o operație de desfrunzire a vitei de vie, în special la nivelul ciorchinilor, pentru o eficiență optimă.

2. Ardei și castraveți:

- Tratamentele se aplică la apariția primelor simptome ale bolii sau ca avertizare.
- Tratamentele se repetă la interval de 8 zile pentru castraveți și la 8-10 zile pentru ardei, în funcție de condițiile climatice, tipul de cultură (protejată sau în câmp) și evoluția bolii.

3. Măr:

- Fobos 100 EC se poate aplica preventiv de la scuturarea petalelor.
- Se aplică la interval de 10 zile între tratamente pentru stoparea infecțiilor primare și controlul infecțiilor secundare de făinare.
- După această perioadă, intervalul dintre tratamente poate fi de 14 zile.

4. Alte culturi:

- Se aplică preventiv și/sau la avertizare în funcție de condițiile locale și presiunea de infecție.
- Intervalul dintre tratamente se adaptează în funcție de condițiile climatice, evoluția bolii și a culturii.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- importanța alternării cu fungicide din alte clase chimice pentru prevenirea rezistenței;
- eficiență în combaterea făinării și altor boli fungice pe diverse culturi;
- absorbție rapidă de către plante, reducând riscul spălării de către ploaie;
- protecție eficientă a tuturor părților plantei prin acțiunea sistemică;
- poate fi inclus în programele de protecție integrată a plantelor;
- acțiune preventivă, curativă și eradicatoare.

COMPATIBILITATE

Fobos 100 EC este compatibil cu numeroase produse fitosanitare. Înainte de utilizare, se recomandă consultarea tabelelor de compatibilitate și efectuarea unui test pe cultura respectivă pentru a verifica reacțiile.