



BRITEX PRO 40 SL

Erbicid sistemic, selectiv, postemergent, pentru combaterea buruienilor graminee anuale, cât și dicotiledonate anuale din cultura de soia și floarea-soarelui în sistemul Clearfield.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Imazamox 40 g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat solubil.

MOD DE ACȚIUNE

Britex Pro 40 SL este un erbicid cu acțiune sistemică, se aplică în perioada de vegetație și se absoarbe de către buruieni prin frunze și rădăcini. Datorită activității reziduale la nivelul solului, produsul asigură combaterea buruienilor în curs de răsărire și a unui nou val care apare ulterior. Buruienile mor la 7-14 zile după aplicare. În plantă, substanța activă este preluată până la nivelul zonelor de creștere, unde blochează sinteza aminoacizilor esențiali, responsabili de creșterea și diviziunea celulară. Combate toate rasele de Orobanche.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Floarea soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul Britex Pro 40 SL)	1,0-1,2	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-8 frunze ale culturii	- (1)
Soia	0,75-1,0		Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-3 frunze adevărate ale culturii (fazele inițiale de dezvoltare ale buruienilor)	

PARTICULARITĂȚI DE APLICARE

Efectul erbicid începe să se observe la 3-7 zile după aplicare. În urma aplicării erbicidului Britex Pro 40 SL, semănatul este posibil:

- grâu, orz, ovăz – după 4 luni;
- porumb, cartof, legume – după 9 luni;
- rapiță, sfeclă de zahăr – după 18 luni.
- A nu se utiliza la hibrizii convenționali de floarea-soarelui.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- erbicid specific pentru hibrizii de floarea-soarelui cu rezistență genetică la Imazamox;
- combatere chimică totală la Orobanche;
- combate un spectru complet de buruieni, inclusiv buruienile monocotile anuale.

COMPATIBILITATE

În dozele recomandate, preparatul este compatibil cu majoritatea preparatelor de uz fitosanitar, la culturile indicate mai sus. Totuși, în anumite cazuri, este necesar să se efectueze un test de compatibilitate. Evitați amestecul preparatului cu erbicidele graminicide.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

Știr – *Amaranthus spp.*, Ambrosia – *Ambrosia elatior*, teișor – *Abutilon theophrasti*, Odos – *Avena fatua*, Busuiocul dracului – *Galinsoga parviflora*, Trei frați pătați – *Viola arvensis*, Lipicioasa – *Galium aparine*, Zârnă – *Solanum nigrum*, Fumarița – *Fumaria officinalis*, Punguliță – *Thlaspi arvense*, Troscot – *Polygonum aviculare*, Muștar sălbatic – *Sinapis arvensis*, mei sălbatic – *Panicum miliaceum*, Mohor – *Setaria viridis*, Meișor roșu – *Digitaria sanguinalis*.