

CONVID 33 EC

CONVID 33 EC este un erbicid sistemic selectiv pentru combaterea buruienilor cu frunză lată din culturile de cereale păioase.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Fluroxipir, 333 g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat emulsionabil.

MOD DE ACȚIUNE ȘI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

CONVID 33 EC este un erbicid sistemic, pe bază de fluroxipir, substanță activă care face parte din grupa chimică a acizilor piridincarboxilici. Fluroxipirul este preluat predominant de frunze și translocat rapid, atât ascendent, cât și descendent către alte părți ale plantelor. Acționează asupra buruienilor sensibile ca o auxină sintetică prin inducerea răspunsurilor tipice auxinelor, cum ar fi răsucirea frunzelor, la numai câteva ore de la aplicarea tratamentului. Plantele sensibile își încetează imediat creșterea și intră în proces de clorozare începând de la vârf, iar în decurs de 7 – 10 zile, în funcție de condițiile locale, sunt distruse total. Fluroxipir nu prezintă activitate reziduală.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Grâu	0,4-0,5	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Prin stropirea semănăturilor în faza de înfrățire –" frunza standard" a culturii	- (1)

PARTICULARITĂȚI DE APLICARE

Se aplică postemergent la culturile de cereale pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene. Se aplică un singur tratament pe aceeași suprafață, într-un sezon. În vederea reducerii competiției cu plantele de cultură, se recomandă ca tratamentele să se aplice în faza de 2 - 4 frunze a buruienilor dicotiledonate.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- eficacitate ridicată în combaterea volburei, turitei, speciilor de hrișcă în toate stadiile de dezvoltare;
- perioadă largă de aplicare la grâu - începând cu stadiul de înfrățire până la frunza standard;
- acțiune sistemică bună - pătrunde rapid în buruieni și blochează dezvoltarea lor.

COMPATIBILITATE

Produsul poate fi compatibil cu alte pesticide folosite în mod curent în Republica Moldova, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test înainte de utilizare.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

Buruieni foarte sensibile	<i>Gallium aparine</i>	Turiță
	<i>Poligonum convolvulus</i>	Hrișcă urcătoare
Buruieni sensibile	<i>Calystegia sepium</i>	Volbură mare
	<i>Capsella bursa pastoris</i>	Traista ciobanului
	<i>Datura stramonium</i>	Ciumăfaie
	<i>Galeopsis tetrahit</i>	Lungurică
	<i>Myosotis arvensis</i>	Nu-mă-uita
	<i>Poligonum aviculare</i>	Troscot
	<i>Poligonum orientale</i>	Hrișca urcătoare
	<i>Rumex crispus</i>	Măcriș
	<i>Rumex obtusifolius</i>	Măcrișul calului
	<i>Solanum nigrum</i>	Zarna
	<i>Stellaria media</i>	Rocoină
	<i>Viola arvensis</i>	Trei frați pătați
	<i>samulastră de floarea soarelui</i>	-
Buruieni moderat sensibile	<i>Cerastium glomeratum</i>	Struna cocoșului
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Volbură
	<i>Sinapis arvensis</i>	Muștar sălbatic
	<i>Thlaspi arvense</i>	Punguliță
Buruieni moderat rezistente	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumărița
	<i>Matricaria chamomila</i>	Mușețel
	<i>Senecio vulgare</i>	Cruciuliță
	<i>Veronica persica</i>	Ventricică