



SUPERKLIN 480 SL

Erbicid sistemic neselectiv pe bază de glifosat. Acest erbicid distruge eficient buruienile perene cu rizomi și drajoni, gramineele și dicotiledonatele anuale, precum și vegetația lemnoasă nedorită.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Glifosat, 480 g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat solubil.

MOD DE ACȚIUNE

Superklin 480 SL pătrunde prin frunze și lăstari verzi în plantă, se răspândește prin partea aeriană și rădăcini, provocând moartea în masă a conurilor de creștere. În celulele ce se divid activ, glifosatul inhibă sinteza de proteine, în special aminoacizi indispensabili (fenilalanina, tirozina și triptofanul).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	2,0-4,0	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Prin stropire în perioada de creștere activă a buruienilor, toamna după recoltare	- (1)
	5,0-6,0	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene		

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE

Acest preparat este cel mai eficient în tratarea plantelor tinere, în creștere activă cu învelișul foliar bine dezvoltat, capabile să absoarbă cea mai mare cantitate posibilă de erbicid și să-l livreze la toate conurile de creștere. Efectele vizuale (schimbarea culorii sau îngălbenirea frunzelor) sunt vizibile în 5-7 zile după tratament la buruienile anuale, în 10-14 zile la buruienile perene cu rizomi și drajoni, în 20-30 zile la copaci și tufișuri. Moartea lor totală are loc în perioada care depășește de două ori perioada menționată anterior. Cu cât este mai mare umiditatea solului și temperatura este optimă în acest moment, cu atât mai repede se observă efectul produsului.

Restricții importante de utilizare a produsului

Nu este permisă tratarea:

- În condiții meteorologice de stres (secetă, căldură, îngheț), când creșterea buruienilor este suspendată sau există semne vizibile de îmbătrânire.
- Imediat după cultivare, atunci când erbicidul nu poate pătrunde în punctele de creștere ale rădăcinii (în special în cazul buruienilor rizomatoase și rădăcinoase).
- Dacă se așteaptă ploaie sau rouă abundentă în 5-6 ore după tratament, când erbicidul poate fi spălat de pe suprafața plantei.
- Dacă utilizați apă murdară care conține particule de sol sau argile care pot absorbi (dilua) o parte a ingredientului activ.
- Când plantele sunt acoperite cu un strat de praf sau murdărie.
- În condiții de vânt puternic atunci când există pericolul de demolare a produsului pulverizat pe culturile învecinate.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- control efectiv al buruienilor anuale și multianuale, precum și vegetației nedorite și arbuștilor;
- eficiență economică ridicată în combaterea buruienilor;
- control de lungă durată, curățarea eficientă a câmpurilor.

COMPATIBILITATE

Superklin 480 SL este compatibil cu erbicidele 2,4 D. Verificați compatibilitatea produselor în fiecare caz.