



INSECTICID

Shenzi® 200 SC

Clorantraniliprol 200 g/l



- Spectru larg de combatere asupra mai multor specii de dăunători
- Insecticid sistemic local, cu mod de acțiune diferit de al celorlalte insecticide cunoscute
 - Acționează prin contact și ingestie
- Protecție excelentă a culturii, acțiune rapidă asupra tuturor stadiilor de dezvoltare (ouă, larve și adulți)
 - Eficacitate ridicată și activitate de lungă durată (14 - 21 de zile)
- Rezistent la spălare - ploaia căzută la 2 ore după tratament nu diminuează eficacitatea produsului
 - Profil toxicologic și ecotoxicologic favorabil, sigur pentru om și mediul înconjurător

Shenzi® 200 SC

Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 839PC/25.04.2023
Suspensie concentrată (SC), substanța activă: clorantraniliprol 200 g/l

Ambalaje
 200 ml
 1 L

Shenzi® 200 SC este un insecticid sistemic local ce acționează prin contact și ingestie.

Cauzează funcționarea neregulată a mușchilor, paralizia insectei, oprirea rapidă a hrănirii, încetarea deplasării și hrănirii și moartea insectei după o perioadă scurtă de timp. Dăunătorii sunt controlați în totalitate după 2-4 zile.

Are efect ovi-larvicid precum și asupra adulților. Combate larvele în toate stadiile larvare.

Timpul de acțiune este de 14-21 zile și depinde de dăunătorul țintă, momentul aplicării și presiunea de atac.

Culturi	Spectru de combatere	Doza	Timp de pauză
Cartof	Gândacul din Colorado (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	50 ml/ha (BBCH 31 - BBCH 48)	14 zile
Măr, păr	Viermele merelor (<i>Cydia pomonella</i>), minatoarea marmorată (<i>Phyllonorychter blancardella</i>), minierul placat (<i>Phyllonorycter corylifoliella</i>), molia pielitei (<i>Adoxophyes orana</i>), eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>), minierul circular al mărunului (<i>Leucoptera scitella</i>)	150 - 175 ml/ha (BBCH 70 - BBCH 87) De la începutul formării fructelor până la maturitatea fructelor	14 zile
Prun	Viermele prunelor (<i>Cydia funebrana</i>)	100 ml/ha (BBCH 70 - BBCH 87) De la începutul formării fructelor până la maturitatea fructelor	14 zile
Cais, piersic, nectarin	Molia orientală a fructelor (<i>Cydia molesta</i>), molia vărgată a piersicului (<i>Anarsia lineatella</i>)	175 ml/ha (BBCH 70 - BBCH 87) De la începutul formării fructelor până la maturitatea fructelor	14 zile
Viță de vie	Molia strugurilor (<i>Lobesia botrana</i>), cochilisul viței de vie (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	150 - 175 ml/ha (BBCH 57 - BBCH 85) De la formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor	30 de zile
Tomate, vinete	Omida fructelor (<i>Helicoverpa armigera</i>), minierul frunzelor de tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	175 ml/ha (BBCH 51 - BBCH 89) Imediat ce prezența ouălor este identificată în cultură sau cel mai târziu la eclozare	1 zi
Morcov, țelină	Musca morcovului (<i>Psila rosae</i>)	175 ml/ha (BBCH 15 - BBCH 89) De la primele frunze formate până înainte de recoltare	21 de zile
Conopidă, broccoli, varză	Buha verzei (<i>Mamestra brassicae</i>), molia verzei (<i>Plutella xylostella</i>), fluturile alb al verzei (<i>Pieris brassicae</i>)	125 ml/ha (BBCH 12 - BBCH 49) De la primele frunze formate până înainte de recoltare	1 zi
Porumb, porumb dulce	Sfredelitorul porumbului (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Omida fructelor (<i>Helicoverpa armigera</i>)	125 ml/ha (BBCH 14 - BBCH 87) De la stadiul de 4 frunze până la maturitatea fiziologică a boabelor	7 zile

Shenzi® 200 SC



Scanează codul QR pentru a afla mai multe informații



@uplromania



UPLromania



@uplromania

®, ™ sunt mărci înregistrate ale grupului UPL și partenerilor săi. Toate drepturile asupra acestui flyer revin UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL. Recomandările din acest flyer sunt de ordin general și nu constituie instrucțiuni de utilizare a produselor. Înaintea utilizării oricărui produs este necesar să respectați cu strictețe, toate indicațiile, măsurile de siguranță și orice alte informații cuprinse în eticheta produsului. UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL nu poate fi făcută răspunzătoare sub nicio formă pentru eventuale daune, de orice natură ar fi acestea, provocate de folosirea informațiilor furnizate în prezentul flyer.

