



FOBOS 100 EC

Системный фунгицид с профилактическим и лечебным действием для защиты семечковых, косточковых, овощных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и других болезней.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Пенконазол, 100 г/л.

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат эмульсии (КЭ).

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Fobos 100 EC является системным фунгицидом, который проникает в растение, быстро распространяется по всем его частям и блокирует синтез эргостерина в мембранах клеток патогенных грибов. Этот процесс нарушает жизнедеятельность гриба, что эффективно препятствует развитию заболеваний. Fobos 100 EC защищает растение от первичной инфекции в начале вегетации и продолжает обеспечивать защиту от вторичной инфекции на протяжении всей вегетации.

- Профилактическое действие:** эффективно предотвращает появление и развитие болезней на ранних стадиях.
- Лечебное действие:** при наличии первых признаков заболевания препарат действует в течение 3-4 суток, блокируя развитие болезни.
- Продолжительность действия:** до 12-14 дней, в условиях эпифитотийного развития инфекции срок защиты может сократиться до 8-10 дней.

РЕГИСТРАЦИЯ В МОЛДОВЕ

| Культура | Норма расхода препарата, кг/га | Спектр действия | Способ, время обработки | Срок ожидания/ (кратность обработки) |
|----------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Яблоня | 0,35-0,45 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 20 (4) |
| Виноград | | | | 20 (2-3) |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- **Профилактическая обработка:** рекомендуется проводить обработку на начальных стадиях вегетации, при первых признаках заболевания или по системе предупреждений.
- **Нормы расхода рабочей жидкости** и дозировка зависят от фазы развития культуры и степени развития болезни:
 - Минимальные дозы используются на ранних стадиях развития культуры и при низкой инфекции.
 - Максимальные дозы применяются при полном развитии листовой поверхности или в условиях высокой инфекционной нагрузки.
- **Интервал между обработками:** не более 12–14 дней для обеспечения эффективной защиты. Для более полного контроля можно чередовать с контактными фунгицидами с аналогичными интервалами.
- **Эффективность:** для достижения наилучших результатов, обработку следует начинать при первых признаках заболевания или в начале вегетации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

- **Антирезистентные программы:** важен для чередования с фунгицидами других химических классов, что предотвращает развитие устойчивости.
- **Широкий спектр применения:** может быть использован на различных культурах, где возникает проблема мучнистой росы.
- **Быстрое поглощение растениями:** снижает риск смывания дождем и сохраняет эффективность.
- **Системная активность:** препарат защищает все части растения, включая те, которые не были обработаны непосредственно.
- **Подходит для интегрированной защиты:** является важным элементом в системах защиты растений, ориентированных на использование разных методов борьбы.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Fobos 100 EC совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых в садоводстве. Однако перед применением рекомендуется проверять совместимость препаратов в конкретных условиях.