




Dr.Yakovlieva

АНТИПАРАЗИТАРНИЙ ГАЙД

Для собак та котів

Про основне, легко і доступно

Хто такі паразити?




Паразити - це організми, які харчуються на поверхні або всередині тіла тварини, виснажують організм, уражають внутрішні органи та викликають різні захворювання.

Зовнішні
(ектоопаразити)

Внутрішні
(ендопаразити)

кліщі, блохи,
волосоїди,
воші, комарі
москіти, мухи
мошки

гельмінти,
найпростіші



Завдання власника:
*запобігти зараженню улюбленця;
вчасно виявити проблему;
не допустити передачі паразитів іншим
тваринам і людині.*

АНТИПАРАЗИТАРНИЙ ГАЙД

ЗОВНІШНІ ПАРАЗИТИ

Блок I - КЛІЩІ

I. Паразитоформні кліщі

1. Хвороби, які передають паразитоформні кліщі
2. Іксодові кліщі поряд
3. Куди найчастіше чіпляються кліщі у собак та котів
4. Що робити, якщо улюбленця вкусив кліщ
5. Як видалити кліща?
6. Які аналізи здати після укусу кліща?
7. Профілактика ураження іксодовими кліщами
8. Діючі речовини, які діють на іксодових кліщів
9. Як працює активна речовина

II. Акариформні кліщі

1. Отодектоз
2. Демодекоз
3. Хейлетіоз
4. Саркоптоз
5. Нотоедроз
6. Шляхи зараження підшкірними кліщами
7. Профілактика ураження підшкірними кліщами
8. Діючі речовини, які діють на підшкірних кліщів.

Іксодові кліщі **пор**

Куди найчастіше чіпляються кліщі у собак та котів

1. Ділянки голови та шиї

Особливо навколо очей, вуха, губи,
підборіддя.

2. Пахви

3. Ділянка паху

Вразлива зона через ніжну шкіру та
близькість судин


4. Між пальцями лап

Закрите та малопомітне місце

5. Під хвостом, навколо ануса, в промежині

Додаткові зони, які слід оглядати:

*Груди, живіт, внутрішня поверхня
стегон, ясна*



Які аналізи здати ?

після укусу кліща

Якщо після укусу кліща в улюбленця спостерігається відмова від їжі, слабкість, апатія, підвищена температура тіла, блювота, пронос, або інші симптоми, слід звернутися до ветеринарного лікаря.

► Через **7-10 днів** після укусу кліща можна здати **ПЛР-аналіз** на поширені захворювання: *Бабезіоз, Анаплазмоз, Ерліхіоз.*

Якщо аналіз здали надто рано — можливий хибнонегативний результат.

► Для виявлення *Бореліозу* метод ПЛР не є інформативним, доцільно здавати аналіз методом **ІФА** через **3-4 тижні** після укусу кліща.

► За умови, що кліща вдалося зняти живим або неушкодженим, його можна здати в лабораторію на дослідження.

Профілактика

</

Діючі речовини

Якщо Ви обрали препарат, в якому немає

Шляхи зараження

Профілакти


АНТИПА

Воші, волосоїди, блохи

Це безкрилі комахи, яких видно
неозброєним оком 🙈

Коротко про кожного:

Воші



Живляться кров'ю

Живуть лише на одному
конкретному виді тварини
(наприклад,

воші собаки — тільки на собаці)

Повзають, не стрибають

Не живуть у середовищі — тільки на
тілі тварини

Зараження — через *тісний контакт*
(наприклад, у притулках)

Волосо

! У

Я

Календар активності паразитів

	Іксові, підшкірні кліщі	Блохи, волосоїди, воші	Комарі	Москити	Мухи	Мошки
Березень	X	X			X	
Квітень	X	X	X		X	X
Травень	X	X	X	X	X	X
Червень	X	X	X	X	X	X
Липень	X	X	X	X	X	X
Серпень	X	X	X	X	X	X
Вересень	X	X	X	X	X	X
Жовтень	X	X	X		X	
Листопад	X	X				
Грудень	X	X				
Січень	X	X				
Лютий	X	X				



— пік активності




— початок та кінець прийому макроциклічних лактонів



— сезон паразитування

для профілактики дирофіляріозу



Діючі речовини від зовнішніх паразитів

	Блюхи	Іксодові кліщі	Отодектоз	Демодекоз	Саркоптоз	Комарі	Мухи
Ізоксазоліни:							
Сароланер	+	+	+	+	+		
Афоксоланер	+	+	+	+	+		
Флураланер	+	+	+	+	+		
Лотіланер	+	+	+	+	+		

