



## ВАССАРД 125 ЕС

Универсальный системный селективный по-слевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах двудольных культур.

### ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Хизалофоп-П-этил, 125 г/л.

### ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат эмульсии.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Быстро проникает через листья и стебли чувствительных сорняков, активно перемещается по сосудистой системе, концентрируется в точках роста, блокируя синтез липидов. Препарат проникает во все части растения, включая корни и корневища, которые также полностью отмирают.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура	Норма расхода препарата л/га	Спектр действия	Способ, время обработки	Срок ожидания/ (кратность обработки)
Сахарная свекла	0,6-0,8	Однолетние однодольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листа однолетних сорняков	- (1)
	1,0	Однолетние и многолетние однодольные сорняки	Опрыскивание посевов при высоте 10-15 см многолетних сорняков	
Соя, Рапс, Подсолнечник	0,6-0,8	Однолетние однодольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листа однолетних сорняков	- (1)
	0,8-1,0	Однолетние и многолетние однодольные сорняки	Опрыскивание посевов при высоте 10-15 см многолетних сорняков	

## ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Baccard 125 EC — универсальный системный селективный граминицид. Визуальный эффект наблюдается уже на 4-5 день после применения, полная гибель сорняков наступает на 7-20 день (надземная часть погибает через 7-10 дней, корневища — через 12-20 дней). Препарат эффективно подавляет все виды злаковых сорняков, в том числе самые устойчивые корневищные: пырей ползучий, свинорой пальчаторый, гумай, все виды мышьяка, тонконога, сорго алеппское, кострец, самосевы культурных злаков, всего около 40 видов. Температура для применения — от 10 до 25 °C. Препарат полностью проникает в растение через 1 час после применения.

### Оптимальные сроки применения:

- Фаза 2-6 листьев у однолетних злаков (до кущения).
- Высота 10-20 см у многолетних злаков, когда листья хорошо развиты для полного и быстрого поглощения гербицида.

Для лучшего эффекта против пырея ползучего рекомендуется не проводить культивацию почвы в течение двух недель после обработки.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

- эффективно борется со всеми видами однолетних и многолетних злаковых сорняков, включая падалицу зерновых.
- быстро усваивается растением, в течение 2-3 часов.
- длительный период защитного действия.
- экономичен — достаточно одного применения препарата в сезон.

### СОВМЕСТИМОСТЬ

- Baccard 125 EC совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов, используемых в Молдове.
- Не смешивайте с гербицидами для борьбы с широколиственными сорняками, так как могут возникнуть антагонистические явления, которые уменьшают эффект или снижают толерантность культуры.
- Не смешивать с продуктами на основе 2,4 D.
- Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

### ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СОРНЯКОВ

#### Однолетние сорняки:

*Phalaris arundinacea* (канареекник), *Bromus* (кострец), *Alopecúrus pratén sis* (лисохвост), *Apera spica-venti* (метлица), *Poa annua* (мятлик однолетний), *Avena fatua* (овсюг обыкновенный), *Lolium* (плевел), *Echinochloa crus-galli* (просо куриное), *Digitaria sanguinalis* (росичка кроваво-красная), *Triticum* (самосевы зерновых), *Setaria viridis* (щетинник зеленый), *Setaria glauca* (щетинник сизый).

#### Многолетние сорняки:

*Brachiaria* (ветвянка), *Sorghum halepense* (гумай, кострец), *Poa trivialis* (мятлик обыкновенный), *Agrostis alba* (полевица белая), *Elymus repens* (пырей ползучий), *Lolium perenne* (райграс пастбищный), *Cynodon dactylon* (свинорой пальчаторый), *Phragmites australis* (тростник обыкновенный).