



PRIDE 105 OD

Pride 105 OD este noul erbicid pentru combaterea buruienilor mono și dicotiledonate anuale și perene din cultura porumbului. Erbicidul posedă o acțiune multiplă, în principal foliară, dar și la sol, radiculară și antigerminativă, ceea ce îl recomandă împotriva buruienilor greu de combătut.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Mesotrion + Nicosulfuron, (75 + 30) g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Dispersie în ulei.

MOD DE ACȚIUNE

Pride 105 OD se poate aplica postemergent, având un interval larg de aplicare, începând cu 3 până la 5 frunze ale culturii de porumb. Se va urmări aplicarea erbicidului Pride 105 OD în stadii timpurii de dezvoltare ale buruienilor: dicotiledonate 2-4 frunze, graminee 2 frunze înainte de înfrățire, costrei din rizomi 10-20 cm.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Porumb	1,25-2,0	Buruieni mono-și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropirea semănăturilor în faza de 3-5 frunze a culturii	- (1)

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE

Doza recomandată în general în cazul îmburuienărilor cu buruieni anuale este de 1,5 l/ha, o doză mai redusă putând fi utilizată când se aplică în stadii timpurii de dezvoltare ale buruienilor. În cazul îmburuienării predominante cu costrei din rizomi se va utiliza doza maximă.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- combinație ideală între două substanțe active pentru un spectru mai larg de buruieni combătute;
- acțiune multiplă, ceea ce îl face eficient în combaterea buruienilor problem;
- formulare unică – OD (ulei dispersabil);

- flexibilitate în alegerea momentului aplicării, începând cu 3 frunze până la stadiul de 5 frunze ale porumbului;
- flexibilitate în alegerea dozei potrivite 1,5-2,0 l/ha;
- selectivitate bună față de cultură;
- soluția dintr-o singură trecere.

COMPATIBILITATE

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

Teișor (*Abutilon theophrasti*), Știr (*Amaranthus spp.*), Spanac sălbatic (*Chenopodium album*), Ciumăfaie (*Datura stramonium*), Trepadatoare (*Mercurialis annua*), Mac (*Papaver rhoeas*), Hrișcă urcătoare (*Polygonum convolvulus*), larba roșie (*Polygonum lapathifolium*), Ardeiul broaștei (*Polygonum persicaria*), Iarbă grasă (*Portulaca oleracea*), Muștar sălbatic (*Sinapis arvensis*), Zârnă (*Solanum nigrum*), Susai asper (*Sonchus asper*), Rocoina (*Stellaria media*), Cornuți (*Xanthium spp.*), Ventrilica (*Veronica persica*), larba bărboasă (*Echinochloa crus-galli*), Meișor (*Digitaria sanguinalis*), Zâzanie (*Lolium spp.*), Mei (*Panicum spp.*), Mohor verde (*Setaria viridis*), Costrei (*Sorghum halapense*), Loboda (*Atriplex spp.*), Pălănidă (*Cirsium arvense*), Busuioc sălbatic (*Galinsoga parviflora*), Trei frați pătați (*Viola arvensis*), Troscot (*Polygonum aviculare*), Traista ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), Hrana vacii (*Spergula arvensis*), Păpădie (*Taraxacum officinale*).