



Substanță activă: 344 r 2,4-D acid/l + Dicamba 120 g/l
sub formă de sare dimetilaminică
Forma preparativă: Concentrat solubil

Ambalaj: cutii din plastic câte 10 l
Termen de garanție: pînă la 3 ani

Preparatul **DICOPUR TOP 464SL** – erbicid selectiv sistemic cu efect post-răsărire pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și a unora perene.

MOD DE ACȚIUNE:

Dicopur Top 464 SL pătrunde în plante prin frunze și lăstarii verzi, se raspandeste în parte aeriană, cauzînd creșterea necontrolată, diviziunea celulară și alungirea tulpinilor buruienilor. Aceasta duce la deformarea tulpinii, epuizarea și moartea plantelor. Datorită compoziției sale **Dicopur Top 464 SL** afectează speciile de buruieni rezistente numai la erbicide pe bază de sare 2,4-D dimetilaminică.

SPECTRUL DE ACȚIUNE:

Turiță agățătoare	Lobodă	Zărnă neagră	Troscotul comun
Muștarul sălbatic	Ambrozia	Lintea	Mac roșu
Triasta ciobanului obișnuită	Aliorul	Pălămidă-de-cîmp	Volbură-de-cîmp
Punguliță de cîmp	Albăstriță comună	Susai-de-cîmp	
Știr	Rocoiana	Floarea soarelui	

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE:

Buruienile perene sunt cel mai bine eliminate în perioada de cea mai mare sensibilitate a lor la preparat:

- volbura-de-cîmp – în stadiul cu lungimea lăstarilor de la 5 la 15 cm, pălămida – în stadiul de rozetă cu 4-6 frunze, buruienile anuale – în stadiul de 2-4 frunze adevărate;
- pe cereale **Dicopur Top 464 SL** se recomandă de aplicat de la înfrățire pînă la apariția lăstarilor (a paiului);
- pe semănăturile de porumb tratarea e recomandabil de efectuat la stadiul de 3-5 frunze. În termeni mai tîrzii preparatul se poate acumula în teaca frunzelor, avînd ca efect scurtarea internodurilor.

Preparatul se aplică în stadii timpurii de dezvoltare ale buruienilor sensibile, care se află în fază de creștere activă, la temperatura aerului nu mai mică de +8 °C.

Pentru o protecție mai completă a porumbului de buruieni, se recomandă utilizarea preparatului în amestec cu Ikanos OD. Un astfel de amestec distruge în mod eficient atât dicotiledonate și monocotiledonate problematice (mei, chirău, etc.)

RATA DE EXPUNERE:

Acțiunea preparatului începe imediat după contactul cu buruienile. Preparatul pătrunde în planta prin frunze și rădăcini și este distribuit sistemic spre conurile de creștere. Simptomele vizuale apar 7-15 zile după tratare, în funcție de condițiile meteorologice, starea fiziologică a buruienilor, fazele de dezvoltare a culturii și a dozei aplicate.

PERIOADA DE ACȚIUNE:

Dicopur Top 464 SL oferă o protecție eficientă a culturilor pînă la apariția unui nou val de buruieni. Perioada de protecție de 30 de zile.

COMPATIBILITATE:

Dicopur Top 464 SL poate fi utilizat în amestec cu **Klinik 360 SL** sau **Credit Xtreme SL** la pregătirea de vară-toamnă a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă. În special bine se manifestă amestecul 2,0-3,0 l/ha **Klinik 360 SL** sau 1,5 – 2,0 l/ha **Credit Xtreme SL** + 0,8 l/ha **Dicopur Top 464 SL** pe miriște și terenuri neprelucrate pentru combaterea unui complex de buruieni anuale și perene.

Preparatul poate fi amestecat cu fungicide și insecticide aplicate în aceeași termeni. Cu toate acestea, în fiecare caz, preparatele ar trebui să fie verificate pentru compatibilitate. Când utilizați erbicid - mix cu alte preparate, ordinea adăugării este următoarea: **SP > WG > SC > EC > Dicopur Top 464 SL**. Fiecare component ulterior se adaugă după dizolvarea completă a celui precedent.

ATENȚIE!

1. Se interzice categoric tratarea culturilor, aflate în stare de stres (secetă, îngheț, suprahidratare), precum și cu cel puțin 5 ore înainte de ploaie. La tratarea culturilor slăbite, dar și după apariția paiului, e posibilă micșorarea randamentului culturii.
2. Este necesar să se asigure că preparatul nu se împrășteie pe culturile învecinate, în special viță-de-vie, rapiță, sfeclă și legume. Viteza vîntului în timpul stropitului nu trebuie să depășească 5 m/sec.
3. Nu se recomandă utilizarea preparatului pe culturile de sfeclă de zahăr și porumb semincer.

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA:

CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	Norma de consum, l/ha	MODUL ȘI TERMENUL DE APLICARE	PERIOADA DE PAUZĂ/ NUMĂRUL DE TRATAMENTE
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	0,6 – 0,8	Prin stropire în faza de înfrățire, până la împăierea culturii	-/ (1)
Porumb		1,0 – 1,5	Prin stropire în faza de 3-5 frunze a culturii	-/ (1)