



SUPERKLIN K 663 SL

Erbicid sistemic neselectiv pe baza de glifosat. Acest erbicid distruge eficient buruienile perene cu rizomi și drajoni, gramineele și dicotiledonatele anuale, precum și vegetația lemnoasă nedorită.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Glifosat (sub formă de sare de potasiu), 663 g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat solubil.

MOD DE ACȚIUNE

Superklin K 663 SL pătrunde prin frunze și alte părți ale plantelor în 4-6 ore de la aplicare și previne reapariția buruienilor perene. Preparatul blochează sinteza proteinelor din plante, ceea ce duce la suprimarea creșterii și moartea buruienilor.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Câmpuri destinate pentru semănatul culturilor agricole, inclusiv în tehnologia No-Till	4,0	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de creștere intensivă a buruienilor, cu 2 săptămâni înainte de semănat.	- (1)

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE

Acest preparat este cel mai eficient în tratarea plantelor tinere, la creșterea activă cu învelișul foliar bine dezvoltat, capabile să absoarbă cea mai mare cantitate posibilă de erbicid și să-l livreze la toate conurile de creștere. Efectele vizuale (schimbarea culorii sau îngălbenirea frunzelor) sunt vizibile în 5-7 zile după tratamentul la buruienile anuale, în 10-14 zile la buruienile perene cu rizomi și drajoni, în 20-30 zile la copaci și tufișuri. Moartea lor totală are loc în perioada care depășește de două ori perioada menționată anterior. Cu cât este mai mare umiditatea solului, iar temperatură este optimală în acest moment, cu atât mai repede se observă efectul produsului.

Restricții importante de utilizare a produsului - nu este permisă tratarea:

- În cazul condițiilor meteorologice de stres (secetă, căldură, îngheț), când creșterea buruienilor este suspendată sau există semne vizibile de îmbătrânire.
- Imediat după cultivare, atunci când erbicidul nu poate pătrunde în punctele de creștere ale rădăcinei (în special în cazul buruienilor rhizomatoase și rădăcinoase).
- Dacă se așteaptă ploaie sau roua abundentă în 5-6 ore după tratament, când erbicidul poate fi spălat de pe suprafața plantei.
- Dacă utilizați apă murdară care conține particule de sol sau argile care pot absorbi (dilua) o parte a ingredientului activ din amestecul rezervorului.
- Când plantele sunt acoperite cu un strat de praf sau murdărie din același motiv.
- În condiții de vânt puternic atunci când există pericolul de împrăștiere a produsului pulverizat pe culturile învecinate.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- manifestă eficacitate sporită în rândul diferitor forme de glifosat;
- glifosatul sub formă de sare de potasiu asigură absorbția și distribuția rapidă a substanței active în întreaga plantă, inclusiv sistemul radicular;
- conținutul ridicat de substanță activă permite utilizarea preparatului în doze mai mici de aplicare;
- cantitatea optimă de adjuvant cu o eficiență înaltă în preparat asigură eficacitate biologică maximă;
- nu are acțiune asupra solului și nu manifestă consecințe asupra culturii;
- permite utilizarea tehnologiilor de protecție a solului cu un consum redus de energie;
- se aplică la orice temperatură pozitivă a aerului până la declanșarea înghețurilor stabile.

COMPATIBILITATE

Preparatul este eficient când este utilizat singur. Poate fi folosit în amestec cu alte erbicide. Verificați compatibilitatea produselor în fiecare caz.