



BACCARD 125 EC

Erbicid sistemic, selectiv, destinat combaterii buruienilor graminee (monocotiledonate) anuale și perene, în culturile de floarea-soarelui, rapiță, soia, sfeclă de zahăr, precum și în alte culturi dicotiledonate.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Quizalofop-P-etil, 125 g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat emulsionabil.

MOD DE ACȚIUNE

Baccard 125 EC conține substanța activă quizalofop-P-etil, ca izomer optic activ, cu acțiune sistemică împotriva buruienilor graminee și selectivă pentru culturile dicotiledonate. Substanța activă este rapid absorbită prin frunzele buruienilor (în circa 2-3 ore) și se translocă în toate punctele de creștere intensă, inclusiv în rădăcini și rizomi. Aici, prin inhibarea unor lipide din celulele meristematice, provoacă moartea buruienilor.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Sfecla de zahăr	0,6-0,8	Buruieni monocotiledonate anuale	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale	- (1)
	1,0	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene	
Soia, rapiță, floarea soarelui	0,6-0,8	Buruieni monocotiledonate anuale	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale	
	0,8-1,0	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene	

PARTICULARITĂȚI DE UTILIZARE

- După 4-5 zile de la aplicare, buruienile tratate își încetează creșterea, frunzele tinere devenind galbene.
- La aproximativ 2 săptămâni după aplicare, întreaga plantă se usucă.
- Acțiunea erbicidă este foarte eficientă împotriva buruienilor monocotiledonate anuale (până în faza de înfrățire) și perene (până la înălțimea maximă de 15-20 cm).
- Produsul este eficient în culturile de floarea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr, furajeră și de masă, rapiță, dar și în alte culturi dicotiledonate.
- Realizează o combatere excelentă a costreii, un tip de buruienă problemă (monocotiledonată perenă).

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- combate eficient toate tipurile de buruieni monocotiledonate, inclusiv samulastra de cereal;
- se absoarbe rapid de către plantă, în 2-3 ore;
- perioadă lungă de acțiune de protecție;
- economic, este suficientă o singură aplicare pe sezon.

COMPATIBILITATE

- Baccard 125 EC este compatibil cu majoritatea insectofungicidelor utilizate în Moldova.
- Nu se amestecă cu erbicide pentru combaterea buruienilor cu frunză lată, deoarece pot apărea fenomene de antagonism care diminuează efectul sau reduc toleranța culturii.
- Se va aștepta minim 3 zile după tratamentul cu Baccard 125 EC pentru combaterea buruienilor cu frunză lată.
- Nu se va amesteca cu produse pe bază de acid 2,4 D.
- Se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate înainte de aplicare.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBATUTE

Monocotiledonate anuale:

Alopecurus myosuroides (coada vulpii), *Agrostis spp.* (iarba câmpului), *Apera spicaventi* (iarba vântului), *Avena spp.* (ovăz sălbatec), *Bromus spp.* (obsiga secarei), *Digitaria spp.* (meșior), *Echinochloa spp.* (mohor lat), *Hordeum muralis* (orzul șoarecilor), *Lolium multiflorum* (raigras italian), *Lolium rigidum* (raigras), *Panicum capillare* (mei), *Panicum taxacum* (mei), *Phalaris spp.* (falaris), *Poa trivialis* (firuță), *Poa pratensis* (firuță), *Setaria spp.* (mohor), *Sorghum halepense* (costrei mare), *Sorghum sativum* (sorg comun), Samulastră porumb.

Monocotiledonate perene:

Agropyron repens (pirul târător), *Agroptis stolonifera*, *Cynodon dactylon* (pir gros), *Sorghum halepense* (costrei din rizomi).